

降下ばいじん測定結果(平成30年1月分)

測定地点	採集液総量 mL	降下ばいじん総量 t/km <sup>2</sup> /月	不溶解性物質総量 t/km <sup>2</sup> /月
加古川神鋼ビル	2220	2.44	1.59
別府小学校	2480	2.38	1.72
西脇雨水ポンプ場	2435	2.78	2.33
別府西小学校	2440	2.06	1.37
尾上小学校	2545	2.07	1.26
別府中学校	2340	1.60	1.10
平岡南小学校	2520	1.86	1.22
平岡小学校	2385	1.63	1.19
環境監視センター	2705	1.67	1.05
中部中学校	2315	1.83	1.16
山手中学校	3010	1.72	0.99
東神吉小学校	2575	2.46	1.74
平荘小学校	2640	1.36	0.76
志方公民館	2530	1.60	0.88

測定地点	不溶解性物質中の灰分 t/km <sup>2</sup> /月	不溶解性物質(灰分)中の鉄 t/km <sup>2</sup> /月	溶解性物質総量 t/km <sup>2</sup> /月
加古川神鋼ビル	1.16	0.27	0.85
別府小学校	1.19	0.22	0.66
西脇雨水ポンプ場	1.31	0.35	0.45
別府西小学校	0.91	0.15	0.69
尾上小学校	0.71	0.10	0.81
別府中学校	0.69	0.11	0.50
平岡南小学校	0.74	0.15	0.64
平岡小学校	0.75	0.09	0.44
環境監視センター	0.50	0.07	0.62
中部中学校	0.69	0.09	0.67
山手中学校	0.55	0.09	0.73
東神吉小学校	1.05	0.15	0.72
平荘小学校	0.37	0.03	0.60
志方公民館	0.45	0.03	0.72

測定地点	溶解性物質中の灰分 t/km <sup>2</sup> /月	採集液のpH —	採集液の塩素イオン t/km <sup>2</sup> /月
加古川神鋼ビル	0.45	6.1 (16°C)	0.19
別府小学校	0.34	6.2 (16°C)	0.15
西脇雨水ポンプ場	0.26	6.3 (16°C)	0.09
別府西小学校	0.36	6.1 (16°C)	0.17
尾上小学校	0.38	5.9 (17°C)	0.18
別府中学校	0.25	6.0 (17°C)	0.15
平岡南小学校	0.29	5.8 (17°C)	0.15
平岡小学校	0.21	6.0 (17°C)	0.11
環境監視センター	0.24	5.4 (17°C)	0.13
中部中学校	0.27	5.8 (16°C)	0.16
山手中学校	0.20	4.7 (17°C)	0.13
東神吉小学校	0.25	4.9 (17°C)	0.12
平荘小学校	0.22	4.8 (17°C)	0.13
志方公民館	0.24	4.7 (17°C)	0.14

測定地点	採集液の硫酸イオン t/km <sup>2</sup> /月	採集液の硝酸イオン t/km <sup>2</sup> /月
加古川神鋼ビル	0.35	0.10
別府小学校	0.35	0.09
西脇雨水ポンプ場	0.32	0.07
別府西小学校	0.35	0.11
尾上小学校	0.35	0.12
別府中学校	0.33	0.10
平岡南小学校	0.32	0.11
平岡小学校	0.30	0.09
環境監視センター	0.32	0.11
中部中学校	0.31	0.11
山手中学校	0.32	0.12
東神吉小学校	0.31	0.10
平荘小学校	0.31	0.11
志方公民館	0.31	0.12