
定期予防接種スケジュール



		標準的な接種年齢	接種回数と 同一種類の予防接種の接種間隔
ロタウイルス	ロタリックス	生後6週0日～24週0日 （1回目の接種は生後2ヵ月～14週6日までに接種を開始するのがのぞましい）	27日以上の間隔で2回
	ロタテック	生後6週0日～32週0日 （1回目の接種は生後2ヵ月～14週6日までに接種を開始するのがのぞましい）	27日以上の間隔で3回
B型肝炎		1歳未満	1回目の接種後27日以上の間隔をおいて2回目を接種。1回目の接種後139日以上の間隔をおいて3回目を接種
小児用 肺炎球菌	初回	生後2ヵ月～5歳未満 **（生後2ヵ月～生後7ヵ月未満で接種を開始するのがのぞましい）**	27日以上の間隔で3回 ※接種開始年齢によって接種回数は異なります
	追加	生後2ヵ月～5歳未満	初回3回目の接種後60日以上の間隔で1回
五種混合 （ジフテリア・百日せき 破傷風・不活化ポリオ・Hib）	初回	生後2ヵ月～7歳6ヵ月未満 **（生後2ヵ月～生後7ヵ月未満で接種を開始するのがのぞましい）**	20日以上の間隔で3回
	追加	生後2ヵ月～7歳6ヵ月未満	初回3回目終了後6ヵ月以上の間隔で1回
BCG		1歳未満 **（生後5ヵ月～生後8ヵ月がのぞましい）**	1回
水痘 （水ぼうそう）	初回	1歳～3歳未満**（1歳～1歳3ヵ月未満で接種を開始するのがのぞましい）**	1回
	追加	1歳～3歳未満 **（初回接種終了後6ヵ月～12ヵ月後に接種をするのがのぞましい）**	初回終了後 3ヵ月以上の間隔で1回
麻しん風しん 混合（MR）	1期	1歳～2歳未満（1歳児）	1回
	2期	小学校就学前1年間の小児 （入学前年度の4月1日～3月31日）	1回
日本脳炎	1期 初回	生後6ヵ月～7歳6ヵ月未満 **（3歳がのぞましい）**	6日以上の間隔で2回
	1期 追加	生後6ヵ月～7歳6ヵ月未満 **（4歳がのぞましい）**	1期初回2回目終了後6ヵ月以上の間隔をおいて1回
	2期	9歳～13歳未満	1期追加接種から4～5年後に1回
二種混合 （ジフテリア・破傷風）		11歳～13歳未満	1回
ヒトパピローマ ウイルス（HPV）		小学6年生～高校1年生 相当年齢の女子	3回または2回 ※15歳未満で接種開始した場合、2回も可 ※接種年齢が近づいたら接種券を送付します

上の表は定期の予防接種の期間です。病気にかかりやすい年齢を考慮して定められた時期（標準的な接種年齢）□の期間中にできるだけ受けましょう。